

LAMISIL CREAM
10MG/G TUBE 15G
EC - Artwork

karo

healthcare

Reason for change:Product owner change,
EC only pack

Correction date:11-04-2025

Artworker:JC

Proof version
2

Print version
X

Artwork No:2003275_1

Karo SKU Number:1003185

Haleon SKU No:60000000211076

Component Type:LEAFLET

Pharma code:825

Language:Spanish

Manufacturing Site:CH Nyon

Approving Market:Ecuador

Product Market Name:LAMISIL

Site Component No:62000000217558

Prev Site Component No:62000000207240

Site Change Control No:201357934

Body Text Size:7.0pt

Leading:7.2pt

Horizontal Scale:100%

Smallest Text Size:7.0pt

Micro Text:No

Dimensions (WxHxD):145 x 72 mm

Machine Drawing ID:AWDRG-1017 v1

Material Spec No:P08

Print Process:Offset lithography

Print Colours: Colourmatch to Pantone Matching System.

K

Technical (Non Printing).

Cutter

Info

OVERPRINT PREVIEW

OFF

Karo Healthcare AB owns this artwork and is not responsible for any changes made by the CMO/printing house. Changes must be communicated with us and we will supply a new print PDF file. Both CMO and printing house are responsible for the printed end result to match the intended colours.

LAMISIL CREMA Antimicótico / Antifúngico

Lea detenidamente este inserto antes de utilizar Lamisil crema. Consérvelo por si necesita volver a leerlo. Consulte a su profesional de la salud si tiene alguna duda.

¿Qué contiene Lamisil Crema?
Cada 100 g contienen 1 g de clorhidrato de Terbinafina. Excipientes: Hidróxido de sodio, alcohol bencílico, estearato de sorbitán, palmitato de cetilo, alcohol estearílico, alcohol cetílico, polisorbato 60, miristato de isopropilo y agua purificada.

¿Para qué sirve Lamisil Crema?
Infecciones micóticas de la piel producidas por dermatofitos tales como Trichophyton (por ejemplo, T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporium canis y Epidermophyton floccosum, por ejemplo, tinea pedis tipo interdigital (pie de atleta), tinea cruris (tinea inguinal: prurito -comezón o picazón- inguinal) y tinea corporis (tinea corporal, dermatofitosis). Pityriasis versicolor (tinea versicolor) causada por Pityrosporum orbiculare (también conocido como Malassezia furfur). Infecciones de la piel por levaduras, principalmente aquellas producidas por el género Candida (por ejemplo, Candida albicans). Tratamiento de tinea pedis de tipo plantar (pie de mocasín).

¿Cómo debe ser usado Lamisil Crema?
Vía de administración: Tópica.
Mayores de 12 años:
Pie de atleta, Tíña inguinal (prurito -comezón o picazón- inguinal) y corporal (dermatofitosis): aplicar una vez al día por una semana.
Tinea pedis (tíña del pie) de tipo plantar: aplicar dos veces al día por dos semanas.
Candidiasis cutánea (intertrigo o sudamina): aplicar una o dos veces al día por una a dos semanas.
Pityriasis versicolor: Aplique una vez o dos veces al día por dos semanas.
Use la crema por el período de tratamiento recomendado, incluso si la infección parece mejorar a los pocos días.
Las infecciones usualmente parecen mejorar a los pocos días, pero pueden reaparecer si la crema no es aplicada regularmente o si el tratamiento se interrumpe demasiado pronto.
La crema debe empezar a mejorar la condición cutánea a los pocos días y continuará actuando incluso después de haber completado el tratamiento.
No utilizar en menores de 12 años.
Si no ha observado mejora dentro de las 2 semanas de iniciado el tratamiento, consulte con su médico o farmacéutico.

Modo de empleo:
• Limpie y seque la piel afectada y el área circundante, y lave sus manos.
• Desenrosque la tapa, y si la usa por primera vez, use la punta de la tapa para perforar la parte superior del tubo, luego presiónelo suavemente.
• Aplique suficiente crema para poner una delgada capa en la piel afectada y el área circundante.
• Frote suavemente.
• Enrosque la tapa en el tubo.
• Lave sus manos para no esparcir la infección en sí mismo u otros.
Si está tratando una infección en pliegues de la piel, puede cubrir el área tratada con una tira de gasa, especialmente por la noche. Si lo hace, use una tira de gasa limpia y fresca cada vez que aplique el producto.

Sobredosis:
Consulte con su médico o farmacéutico de inmediato si ingiere accidentalmente este medicamento.

¿Cuándo no debe usarse Lamisil Crema?
No utilice el producto si usted es alérgico o hipersensible a la

Terbinafina o a cualquiera de los excipientes del producto.

¿Qué precauciones deben tomarse cuando se usa Lamisil Crema?

- Si el producto entra accidentalmente en los ojos, enjuáguelos minuciosamente con agua. Consulte a su médico si continúa la molestia.
- No se debe permitir que los lactantes entren en contacto con ninguna parte de piel tratada, incluidos los senos.
- Exclusivo para uso externo.
- No ingiera el producto ni lo utilice en la boca.
- No está indicado para infecciones micóticas en las uñas. Si usted tiene una infección micótica en las uñas (hongos dentro y por debajo de las uñas), con decoloración de las uñas y cambio en la textura de estas (gruesas, escamosas), debe consultar con un médico.
- Tenga en cuenta que en casos poco frecuentes la infección micótica subyacente puede empeorar.
- Si se la aplica en el rostro, manténgala alejada de los ojos.
- Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
- Alcohol cetílico y el alcohol estearílico pueden causar reacciones cutáneas locales (por ejemplo, dermatitis de contacto).

¿Puede ser utilizado Lamisil Crema durante el embarazo o el período de lactancia?
Si está embarazada o tiene planeado quedar embarazada, busque asesoramiento médico antes de utilizar productos que contengan Terbinafina. No lo utilice durante el período de lactancia. Los lactantes no deben estar en contacto con ningún área tratada, incluidos los senos. Los ingredientes pueden pasar a la leche materna.

¿Qué reacciones secundarias puede causar Lamisil Crema?
Cuando use este producto usted tal vez experimente:

- Descamación de la piel, picazón.
- Lesión en la piel, costra, trastorno de la piel, cambios en el color de la piel, enrojecimiento, ardor, dolor o irritación del sitio de aplicación.

Otros eventos adversos incluyen:

- Piel seca, eccema.
- Dermatitis de contacto que es un tipo de inflamación de la piel.
- Erupción cutánea.
- Empeoramiento de los síntomas de la enfermedad.
- Reacción alérgica.

Si se aplica accidentalmente en los ojos puede ocurrir irritación ocular.
Si usted tiene alguna otra reacción adversa, consulte a su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible reacción adversa no listada en este inserto.

¿Cómo debe almacenar Lamisil Crema?
Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.
No utilice el producto después de la fecha de expiración que se indica en el empaque.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y VISTA DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIONES COMERCIALES:
Crema x 15 g

Fabricado por: Haleon CH SARL, Route de L'Etraz 2 1260, Nyon - Suiza. Para: Karo Healthcare AB, Box 16184, 103 24 Estocolmo, Suecia.


Titular del RS: Servicios Empletex S.A., Quito - Ecuador. Número de Registro Sanitario 29501-11-10. Venta Libre.

FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN: Versión (Julio 2021) GDS v1.0

2003275_1/62000000217558

Page: 1 of 3

Verso



TECHNICAL INFORMATION		
62000000123456	SITE COMPONENT NUMBER 123456 : DUMMY for positioning only Background: No color Use the 14-digit site component number	
	R PHARMACODE AREA TEXT & GRAPHICS FREE SARTING POINT ON THE LEFT BAR HEIGHT : 7.0 mm CODE LENGTH : VARIABLE	
	TEXT AND GRAPHIC FREE AREA Blank or Technical Area	
	COPY AREA Text and Graphic Area	
	CUT CREASE/FOLD Recto - Exterior fold Verso - Interior fold	
Surface = 304.50 cm²		
STUDIO REFERENCE No.		N/A
SUPPLIER REFERENCE No.		
DRAWING OWNER (SITE)		NYON
LEAFLET 145 X 210 MM		
DRAWING No.		AWDRG-1017
		V1
COPYRIGHT AND DESIGN RIGHT IS THE PROPERTY OF THE GLAXOSMITHKLINE GROUP OF COMPANIES		
SCALE: 1:1 ALL DIMS. IN MILLIMETRES		GENERAL DRAWING TOLERANCE UNLESS STATED OTHERWISE N/A